

|        |              |
|--------|--------------|
| 患者 I D | @patientid   |
| 患者氏名   | @patientname |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 診療科   | @PATIENTFORMALSECTIONNAME |
| 主治医 1 | @USERNAME                 |
| 主治医 2 |                           |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 身長    | \$height01_doc | c m            |
| 体重    | \$weight01_doc | k g            |
| 体表面積  | \$体表面積_Doc     | m <sup>2</sup> |
| アレルギー |                |                |
| 副作用歴  |                |                |
| 病 名   | # 1            | 告知 (有、無)       |
|       | # 2            | 告知 (有、無)       |

|  |
|--|
| 治療目的 (いずれにか○)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| ロンサーフ+ベバシズマブ療法 第 コース                |
| 通常用量                                |
| ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15              |
| ロンサーフ 70mg/m <sup>2</sup> day1-day5 |
| day8-day12                          |
| (4 週毎)                              |

| 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 投与量             |
|-----------------------|-----------------|
| 1.07 未満               | 35mg/回(70mg/日)  |
| 1.07 以上~1.23 未満       | 40mg/回(80mg/日)  |
| 1.23 以上~1.38 未満       | 45mg/回(90mg/日)  |
| 1.38 以上~1.53 未満       | 50mg/回(100mg/日) |
| 1.53 以上~1.69 未満       | 55mg/回(110mg/日) |
| 1.69 以上~1.84 未満       | 60mg/回(120mg/日) |
| 1.84 以上~1.99 未満       | 65mg/回(130mg/日) |
| 1.99 以上~2.15 未満       | 70mg/回(140mg/日) |
| 2.15 以上~              | 75mg/回(150mg/日) |

\*ベバシズマブ投与は忍容性が良好であれば、2 回目は 60 分、それ以降は 30 分投与が可能。

\*ロンサーフ配合錠 T15(       錠) / 分 2 (朝・夕)  
 ロンサーフ配合錠 T20(       錠) / 分 2 (朝・夕)

第 1 日目 (    月    日)

|                 |              |       |                |                   |
|-----------------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| 開始 0:00         | 生食           | 50ml  | 1 P            | 点滴路確保用<br>プライミング用 |
| 直後から<br>終了 0:30 | 生食<br>ベバシズマブ | 100ml | 1 P<br>_____mg | 点滴静注(90 分)        |
|                 | 生食           | 50ml  | 1 P            | フラッシュ抜針           |

(前日)

(当日)

| 施行日 | 払出薬剤師 | 監査薬剤師 | 受取看護師 | 混注薬剤師 | 監査薬剤師 | 施行看護師 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |       |       |       |       |       |       |

第 1 5 日目 (    月    日)

|                 |              |       |                |                   |
|-----------------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| 開始 0:00         | 生食           | 50ml  | 1 P            | 点滴路確保用<br>プライミング用 |
| 直後から<br>終了 0:30 | 生食<br>ベバシズマブ | 100ml | 1 P<br>_____mg | 点滴静注(90 分)        |
|                 | 生食           | 50ml  | 1 P            | フラッシュ抜針           |

(前日)

(当日)

| 施行日 | 払出薬剤師 | 監査薬剤師 | 受取看護師 | 混注薬剤師 | 監査薬剤師 | 施行看護師 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |       |       |       |       |       |       |