

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

身長	\$height01_doc	cm
体重	\$weight01_doc	kg
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

TS-1+CPT-11+Bev 療法	第	コース
通常用量		
S-1	40~60mg	1日2回 day1-14
イリノテカン	100mg / m <sup>2</sup>	day1,15
ベバシズマブ	5mg / kg	day 1, 15
	(4週毎)	

エスワン 1回 40mg ≤1.25 m<sup>2</sup>  
 1回 50mg 1.25 - 1.5 m<sup>2</sup>  
 1回 60mg 1.5 ≤

\*エスワン 20mg( cap) / 分2(朝・夕)  
 25mg( cap) / 分2(朝・夕)

\*アプレピタント処方する  
 第1日目 ( 月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	1 A	
開始 0:30	生食	100ml	1 P	点滴静注 (初回 90分) (2回目 60分) (3回目以降 30分)
終了	ベバシズマブ		_____mg	
開始	生食	500ml	1 P	
終了	イリノテカン		_____mg	点滴静注(90分)
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日) (当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目 ( 月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	1 A	
開始 0:30	生食	100ml	1 P	点滴静注 (初回 90分) (2回目 60分) (3回目以降 30分)
終了	ベバシズマブ		_____mg	
開始	生食	500ml	1 P	
終了	イリノテカン		_____mg	点滴静注(90分)
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日) (当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師