

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$wheight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ療法 第 コース		
通常用量		
カルボプラチン	AUC6	day1
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15
キイトルーダ	200mg/body	day1 (3 週毎)

\* 特定生物由来製品の説明、同意書必要

第 1 日目 ( 月 日)

メインルート			
開始 0:00	生食	50ml	1 P 点滴路確保用 プライミング用
直後から 終了 0:30	生食 キイトルーダ	100ml	1 P 点滴静注(30分) 200 mg (フィルター使用)
	生食	50ml	1 P フラッシュ
側管			
開始 0:30 終了 1:00	パロノセトロン点滴静注バッグ 50ml アロカリス 235mg 10ml デキサート 3.3mg	1 P 1 B 1 A	点滴静注(30分)
開始 1:00 終了 1:30	アブラキサン	_____ mg	点滴静注(30分) 抜き取り量(ml)= 1回投与量/5mg/ml
	生食	50ml	(全量 ml) アブラキサン溶解用 100mg/Bを20mlで溶解
	生食	50ml	1 P フラッシュ
開始 1:30 終了 2:30	5%ブドウ糖 250ml カルボプラチン	1 P _____ mg	点滴静注(1時間)
	生食	50ml	1 P フラッシュ抜針

\* アブラキサンフィルター禁止

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第8日目 ( 月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ 100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	2 A	
開始 0:30	アブラキサン	_____ mg	点滴静注(30分) 抜き取り量(ml)= 1回投与量/5mg/ml
終了 1:00	生食 50ml	(全量 ml)	
	生食 50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目 ( 月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ 100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	2 A	
開始 0:30	アブラキサン	_____ mg	点滴静注(30分) 抜き取り量(ml)= 1回投与量/5mg/ml
終了 1:00	生食 50ml	(全量 ml)	
	生食 50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師