

患者 I D	@patientid
患者氏名	@patientname
診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いざれにか〇)
・ 進行・再発癌
・ 術前・術後 補助化学療法

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$weight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m ²
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
wTC 療法	第	コース
通常用量		
パクリタキセル	80mg/m ²	day 1, 8, 15
カルボプラチナ	AUC 5	day 1
		(4 週毎)

第1日目 (月 日)

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 0:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:15	レスタミンコーワ	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン	20mg	1 A	側注
	生食	20ml	1 P	
開始 0:15	パロノセトロン点滴静注バッグ	50ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:45	アロカリス 235mg	10ml	1 B	
開始 0:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 1:45	パクリタキセル		mg	フィルター使用
開始 1:45	5%ブドウ糖	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 2:45	カルボプラチナ		mg	
	生食	50ml	1 P	フラッシュ拔針

(前日)

(当日)

施行日	派出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第8日目 (月 日)

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 0:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:15	レスタミンコーワ錠	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン	20mg	1 A	側注
	生食	20ml	1 P	
開始 0:15	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:45				
開始 0:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 1:45	パクリタキセル		mg	フィルター使用
	生食	50ml	1 P	フラッシュ拔針

(前日)

(当日)

施行日	派出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目(月日)

開始 0:00 終了 0:15	生食 デキサート	100ml 3.3mg	1 P 2 A	点滴静注(15分)
開始 0:15	レスタミンコーワ錠	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン 生食	20mg 20ml	1 A 1 P	側注
開始 0:15 終了 0:45	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
開始 0:45 終了 1:45	生食 パクリタキセル	250ml	1 P mg	点滴静注(1時間) フィルター使用
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	派出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師