

患者 I D	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$wheight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病 名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
DBd(1-3)療法		第 コース
通常用量		
ダラザレックス 16mg/kg day 1, 8,15		
ベルケイド 1.3mg/m <sup>2</sup> day 1, 4, 8, 11(皮下)		
デキサメタゾン 20mg/body (点滴又は内服)		
day1,2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15		
(3 週毎)		

**ダラザレックス投与中はモニター監視**

2 回目以降は原則不要。ただし主治医の指示により施行する。

**ダラザレックス投与速度**

投与時期	ダラザレックス投与開始からの投与速度(mL/hr)			
	0~1 時間	1~2 時間	2~3 時間	3 時間以降
初回投与	25	50	75	100
2 回目投与(*1)	50	100	150	200
3 回目投与以降	100(*2)	150	200	

- ・ 初回投与開始時から 3hr 以内に infusion reaction が認められなかった場合、2 回目投与(\*1)とすることができる。
- ・ 初回投与最終速度 50mL/hr 以上および 2 回目投与时終速度が 100mL/hr 以上で infusion reaction が認められなかった場合、100mL/hr(\*2)から行うことができる。
- ・ infusion reaction が発現した場合、投与速度の変更等、適切な処置を行う。

第 1 日目 ( 月 日)

開始 0:00	ベルケイド	_____ mg (全量 ml)	皮下注 抜き取り量(ml)= 1 回投与量/2.5/mg/ml
	生食 20ml	1 P	ベルケイド溶解用 3mg/B を 1.2ml で溶解

施行看護師	注射部位

内服 0:00	カロナール錠 200mg	2 T	内服
開始 0:00	生食 100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	5 A	
開始 0:00	ポララミン注 5mg	1 A	側注
開始 0:30	生食 100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 1:00			
開始 1:00	生食 500ml ダラザレックス	1 P _____ mg	25ml/hr (1:00~2:00) 50ml/hr (2:00~3:00) 75ml/hr (3:00~4:00) 100ml/hr (4:00~) フィルター使用
	生食 50ml	1 P	フラッシュ用

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第4日目 ( 月 日)

開始 0:00	ベルケイド	_____ mg (全量 ml)	皮下注 抜き取り量(ml)= 1回投与量/2.5/mg/ml
	生食 20ml	1 P	ベルケイド溶解用 3mg/Bを1.2mlで溶解

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師	注射部位

第8日目 ( 月 日)

開始 0:00	ベルケイド	_____ mg (全量 ml)	皮下注 抜き取り量(ml)= 1回投与量/2.5/mg/ml
	生食 20ml	1 P	ベルケイド溶解用 3mg/Bを1.2mlで溶解

施行看護師	注射部位

内服 0:00	カロナール錠 200mg	2 T	内服
開始 0:00	生食 100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	5 A	
開始 0:00	ポララミン注 5mg	1 A	側注
開始 0:30	生食 100ml	1 P	点滴静注(30分)
開始 1:00	生食 500ml ダラザレックス	1 P _____ mg	25ml/hr (1:00~2:00) 50ml/hr (2:00~3:00) 75ml/hr (3:00~4:00) 100ml/hr (4:00~) フィルター使用
	生食 50ml	1 P	フラッシュ用

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第11日目 ( 月 日)

開始 0:00	ベルケイド	_____ mg (全量 ml)	皮下注 抜き取り量(ml)= 1回投与量/2.5/mg/ml
	生食 20ml	1 P	ベルケイド溶解用 3mg/Bを1.2mlで溶解

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師	注射部位

第15日目 ( 月 日)

内服 0:00	カロナール錠 200mg	2 T	内服
開始 0:00	生食 100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	5 A	
開始 0:00	ポララミン注 5mg	1 A	側注
開始 0:30	生食 100ml	1 P	点滴静注(30分)
開始 1:00	生食 500ml ダラザレックス	1 P _____ mg	25ml/hr (1:00~2:00) 50ml/hr (2:00~3:00) 75ml/hr (3:00~4:00) 100ml/hr (4:00~) フィルター使用
	生食 50ml	1 P	フラッシュ用

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師