

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$weight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

R-Benda 療法	第	コース
通常用量		
リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	day 1
トレアキシン	90mg/m <sup>2</sup>	day 2, 3
	(4 週毎)	

リツキサン投与中はモニター監視 (初回)

2 回目以降は原則不要。ただし主治医の指示による施行する。

第 1 日目 ( 月 日 )

内服 0:00	カロナール錠	200mg	2 T	経口(初回のみ)
開始 0:00	ポララミン注	5mg		静注
開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	ソルメドロール	125mg	1 P	
開始 0:30~	生食	500ml	1 P	25ml/hr (0:30~1:30) 100ml/hr (1:30~2:30 ) 200ml/hr (2:30~ ) *初回副作用がなければ 2 回目以降は 100ml/hr で開始。
	リツキシマブ	_____mg		
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第 2 日目 ( 月 日 ) 第 3 日目 ( 月 日 )

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30				
開始 0:30	生食	50ml	1 P	点滴静注(10分)
終了 0:40	トレアキシン	_____mg		
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師