

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

身長	\$height01_doc	cm
体重	\$weight01_doc	kg
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
A+AVD(1)療法 第 _____ 第 _____ コース		
通常用量		
ドキシソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	day 1,15
アドセトリス	1.2mg/kg	day 1,15
エクザール	6mg/m <sup>2</sup>	day 1,15
(1回投与量 10mg/body まで)		
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	day 1,15
(4週毎)		
最大 6 コース		

第 1 日目 ( 月 日 )

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	ホスアプレピタント	150mg	1 B	
開始 0:30	パロノセトロン点滴静注バッグ	50ml	1 B	点滴静注(30分)
終了 1:00	デキサート		3 A	
開始 1:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 1:30	注射用蒸留水	20ml	1 P	ドキシソルビシン溶解用
	ドキシソルビシン		_____ mg	
開始 1:30	生食	50ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 1:45	エクザール		_____ mg	
開始 1:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 2:45	ダカルバジン		_____ mg	(遮光必要)
	注射用蒸留水	100ml	1 P	ダカルバジン溶解用
				100mg/10ml で溶解
	生食	50ml	1 P	フラッシュ
内服 2:45	カロナル錠	200mg	2 T	経口
開始 2:45	ポララミン注	5mg	1 A	静注
開始 2:45	生食	50ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 3:15				
開始 3:15	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 3:45	アドセトリス		_____ mg	
	注射用蒸留水	20ml	1 P	アドセトリス溶解用
			または	50mg/B 10.5ml で
			2 P	溶解
開始 3:45	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目 ( 月 日 )

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:30	ホスアプレピタント	150mg	1 B	
開始 0:30	アロキシ点滴静注バッグ	50ml	1 B	点滴静注(30分)
終了 1:00	デキサート		3 A	
開始 1:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分) ドキシソルビシン溶解用
終了 1:30	注射用蒸留水 ドキシソルビシン	20ml _____mg	1 P	
開始 1:30	生食	50ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 1:45	エクザール		_____mg	
開始 1:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間) (遮光必要)
終了 2:45	ダカルバジン		_____mg	
	注射用蒸留水	100ml	1 P	ダカルバジン溶解用 100mg/10ml で溶解
	生食	50ml	1 P	フラッシュ
開始 2:45	ポララミン注	5mg	1 A	静注
開始 2:45	生食	50ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 3:15				
開始 3:15	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 3:45	アドセトリス		_____mg	
	注射用蒸留水	20ml	1 P または 2 P	アドセトリス溶解用 50mg/B 10.5ml で 溶解
開始 3:45	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師