

患者 I D	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 進行・再発癌 ・ 術前・術後 補助化学療法

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$weight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m ²
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
CBDCA+GEM 療法 第		コース
通常用量		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1, 8, 15
カルボプラチン	AUC 4	day 2
	(4 週毎)	

*カルボプラチン投与時アプレピタント処方する

第 1 日目 (月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:30	生食	100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 1:00	ゲムシタビン	_____mg		
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日) (当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第 2 日目 (月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	1 A	
開始 0:30	5%ブドウ糖	250ml	1 P	点滴静注(1 時間)
終了 1:30	カルボプラチン	_____mg		
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日) (当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第 8 日目 (月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:30	生食	100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 1:00	ゲムシタビン	_____mg		
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日) (当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目 (月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1	P	点滴静注(30分)
終了 0:30	デキサート	3.3mg	2	A	
開始 0:30	生食	100ml	1	P	点滴静注(30分)
終了 1:00	ゲムシタビン			mg	
	生食	50ml	1	P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師