

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進行・再発癌</li> <li>・ 術前・術後 補助化学療法</li> </ul>

身長	\$height01_doc	cm
体重	\$weight01_doc	kg
体表面積	\$体表面積_Doc	m <sup>2</sup>
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
カドサイラ療法	第	コース
通常用量	カドサイラ 3.6 mg/kg (3 週毎)	
カドサイラ投与時間	は 30 分まで短縮可能	

初回のみカロナール 200mg 2錠内服

( 月 日)

開始 0:00	生食 50ml	1 P	点滴路確保用 プライミング用
直後から 終了 1:30	生食 250ml 注射用水 20ml カドサイラ 使用量 (抜取量)	1 P 1 P ( )ml×20=( )mg	点滴静注(90分) フィルター使用
	生食 50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師