

患者 I D	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 進行・再発癌 ・ 術前・術後 補助化学療法

身長	\$height01_doc	c m
体重	\$weight01_doc	k g
体表面積	\$体表面積_Doc	m ²
アレルギー		
副作用歴		
病 名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
T-mab+Perjeta+DTX 療法 第 コース		
通常用量 トラスツズマブ 8mg / kg パーজেタ 840mg / body ドセタキセル 75 mg / m ² (3 週毎) トラスツズマブの投与時間は 30 分まで短縮可能 パーজেタの投与時間は 30 分まで短縮可能		

トラスツズマブ初回のみカロナル 200mg 2錠内服

(月 日)

開始 0:00	グラニセトロン 3mg バッグ 100ml	1 P	点滴静注(30 分)
終了 0:30	デキサート 3.3mg	2 A	
開始 0:30	生食 250ml	1 P	点滴静注(1 時間)
終了 1:30	ドセタキセル _____mg		
開始 1:30	生食 100ml	1 P	点滴静注(1 時間)
開始 2:30	パーজেタ 420mg	2 B	
開始 2:30	生食 100ml	1 P	点滴静注(90 分)
終了 4:00	注射用水 20ml	1 P	
	トラスツズマブ _____mg		抜き取り量 投与量/21=ml
	生食 50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師