

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 進行・再発癌 ・ 術前・術後 補助化学療法

身長	\$height01_doc	cm
体重	\$weight01_doc	kg
体表面積	\$体表面積_Doc	m ²
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
wPTX+ベバシズマブ療法 第 第 コース		
通常用量		
パクリタキセル 90mg/m ² day 1, 8, 15		
ベバシズマブ 10mg/kg day 1, 15 (4週毎)		

*ベバシズマブ投与は忍容性が良好であれば、2回目は60分、それ以降は30分投与が可能。

第1日目 (月 日)

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 0:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:15	レスタミンコーワ錠	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン	20mg	1 A	側注
	生食	20ml	1 P	
開始 0:15	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:45				
開始 0:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 1:45	パクリタキセル		_____mg	フィルター使用
開始 1:45	生食	100ml	1 P	点滴静注(90分)
終了 3:15	ベバシズマブ		_____mg	
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第8日目 (月 日)

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 0:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:15	レスタミンコーワ錠	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン	20mg	1 A	側注
	生食	20ml	1 P	
開始 0:15	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:45				
開始 0:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 1:45	パクリタキセル		_____mg	フィルター使用
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第15日目 (月 日)

開始 0:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 0:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 0:15	レスタミンコーワ錠	10mg	5 錠	内服
	ファモチジン	20mg	1 A	側注
	生食	20ml	1 P	
開始 0:15	グラニセトロン 3mg バッグ	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 0:45				
開始 0:45	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 1:45	パクリタキセル		_____mg	フィルター使用
開始 1:45	生食	100ml	1 P	点滴静注(90分)
終了 3:15	ベバシズマブ		_____mg	
	生食	50ml	1 P	フラッシュ抜針

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師