化学療法剤治療計画書　　GEM+nab-PTX 療法　　膵臓癌

患者ＩＤ	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医１	@USERNAME
主治医２	

治療目的（いずれにか○）
- 進行・再発癌
- 術前・術後　補助化学療法

身長	$height01_doc	ｃｍ
体重	$wheight01_doc	ｋｇ
体表面積	$体表面積_Doc	㎡
アレルギー		
副作用歴		
病　名	＃１	告知（有、無）
	＃２	告知（有、無）

GEM+nab-PTX 療法　　第　　コース

通常用量
ゲムシタビン　1000mg／㎡　day1, 8, 15
アブラキサン　125mg／㎡　day1, 8, 15
(4 週毎)

＊特定生物由来製品の説明、同意書必要

第１日目（　　月　　日）

開始　0:00 終了　0:30	パロノセトロン点滴静注バッグ　50ml デキサート　3.3mg	1　P 2　A	点滴静注(30 分)
開始　0:30 終了　1:00	アブラキサン	＿＿＿mg	点滴静注(30 分) 抜き取り量(ml)＝ 1 回投与量／5mg/ml
	生食　50ml	(全量　　ml)	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 100mg/B を 20ml で溶解
	生食　50ml	1　P	フラッシュ
開始　1:00 終了　1:30	生食　100ml ゲムシタビン	1　P ＿＿＿mg	点滴静注(30 分)
	生食　50ml	1　P	フラッシュ抜針

（前日）　　（当日）

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第８日目（　　月　　日）

開始　0:00 終了　0:30	アロキシ点滴静注バッグ　50ml デキサート　3.3mg	1　P 2　A	点滴静注(30 分)
開始　0:30 終了　1:00	アブラキサン	＿＿＿mg	点滴静注(30 分) 抜き取り量(ml)＝ 1 回投与量／5mg/ml
	生食　50ml	(全量　　ml)	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 100mg/B を 20ml で溶解
	生食　50ml	1　P	フラッシュ
開始　1:00 終了　1:30	生食　100ml ゲムシタビン	1　P ＿＿＿mg	点滴静注(30 分)
	生食　50ml	1　P	フラッシュ抜針

（前日）　　（当日）

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第１５日目（　　月　　日）

開始　0:00 終了　0:30	アロキシ点滴静注バッグ　50ml デキサート　3.3mg	1　P 2　A	点滴静注(30 分)
開始　0:30 終了　1:00	アブラキサン	＿＿＿＿mg	点滴静注(30 分) 抜き取り量(ml)＝ 1 回投与量／5mg/ml
	生食　50ml	(全量　　ml)	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 100mg/B を 20ml で溶解
	生食　50ml	1　P	フラッシュ
開始　1:00 終了　1:30	生食　100ml ゲムシタビン	1　P ＿＿＿＿mg	点滴静注(30 分)
	生食　50ml	1　P	フラッシュ抜針

（前日）　　（当日）

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師