

患者ID	@patientid
患者氏名	@patientname

診療科	@PATIENTFORMALSECTIONNAME
主治医 1	@USERNAME
主治医 2	

治療目的 (いずれにか○)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 進行・再発癌 ・ 術前・術後 補助化学療法

身長	\$height01_doc	cm
体重	\$weight01_doc	kg
体表面積	\$体表面積_Doc	m ²
アレルギー		
副作用歴		
病名	# 1	告知(有、無)
	# 2	告知(有、無)
GEM+CDDP+デュルバルマブ療法 第 コース		
通常用量		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day 1, 8
シスプラチン	25 mg/m ²	day 1, 8
イミフィンジ	1500mg/body	day 1 (3週毎)

第 1 日目 (月 日)

開始 0:00	ラクテック	500ml	1 P	点滴静注(90分)
終了 1:30				
開始 1:30	ソルデム 3 A	500ml	1 P	点滴静注(90分)
終了 3:00				
開始 3:00	生食	100ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 4:00	イミフィンジ		<u>1500mg</u>	(フィルター使用)
開始 4:00	パロノセトロン点滴静注バッグ	50ml	1 P	点滴静注(15分)
終了 4:15	デキサート	3.3mg	2 A	
開始 4:15	ラシックス	20mg	1 A	側注
開始 4:15	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 5:15	シスプラチン		<u> mg</u>	
開始 5:15	生食	250ml	1 P	点滴静注(1時間)
終了 6:15				
開始 6:15	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 6:45	ゲムシタビン		<u> mg</u>	
開始 6:45	生食	100ml	1 P	点滴静注(30分)
終了 7:15				

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師

第8日目 (月 日)

開始 0:00 終了 1:30	ラクテック 500ml	1 P	点滴静注(90分)
開始 1:30 終了 3:00	ソルデム3A 500ml	1 P	点滴静注(90分)
開始 3:00 終了 3:15	パロノセトロン点滴静注バッグ 50ml デキサート 3.3mg	1 P 2 A	点滴静注(15分)
開始 3:15	ラシックス 20mg	1 A	側注
開始 3:15 終了 4:15	生食 シスプラチン	1 P _____mg	点滴静注(1時間)
開始 4:15 終了 5:15	生食 250ml	1 P	点滴静注(1時間)
開始 5:15 終了 5:45	生食 ゲムシタビン 100ml	1 P _____mg	点滴静注(30分)
開始 5:45 終了 6:15	生食 100ml	1 P	点滴静注(30分)

(前日)

(当日)

施行日	払出薬剤師	監査薬剤師	受取看護師	混注薬剤師	監査薬剤師	施行看護師